

Vaccinationsoversigt

Vaccinationer til børn pr. 1. januar 1997
Tidspunkterne bør så vidt muligt overholdes

Vaccine	Antal og tidspunkter	Normale vaccinationsreaktioner	Beskyttelsesvarighed
Di-Te-Ki-Pol-Vaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio	3 injektioner 3 mdr.s alder 5 mdr.s alder 12 mdr.s alder	Rødme og hævelse på injektionsstedet, evt. let feber og utilpashed i et døgnstid efter vaccinationen	Beskyttelse mod stivkrampe og difteri varer mindst 5 år efter de 3 injektioner. Beskyttelsens varighed imod kighoste er endnu ikke endeligt afklaret, men anses at være mindst 3 år
Di-Te-Vaccination Revaccination mod difteri og stivkrampe	1 injektion 5 års alder	Rødme og hævelse på injektionsstedet, evt. let feber og utilpashed i et døgnstid efter vaccinationen	Revaccination i 5 års alderen giver yderligere beskyttelse i mindst 10 år mod stivkrampe og difteri

Vaccine	Antal og tidspunkter	Normale vaccinationsreaktioner	Beskyttelsesvarighed
Hib-Vaccination Vaccination mod én af meningitiformerne og mod strubelågsbetændelse	3 injektioner 3 mdr.s alder 5 mdr.s alder 12 mdr.s alder	Rødme og hævelse på injektionsstedet, evt. let feber og utilpashed i et døgnstid efter vaccinationen	Beskytter i de år i barnealderen, hvor der er risiko for sygdom forårsaget af bakterien <i>Hæmophilus influenzae</i> type b
MFR-Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde	2 injektioner 15 mdr.s alder 12 års alder	Et par dages ubehag med feber, snue eller udslæt, oftest i 2. uge efter vaccinationen. Dette er ikke smitsomt	Antagelig livslang
Poliodråber Vaccination mod polio	3 gange 2 års alder 3 års alder 4 års alder	Ingen	Livslang

Kilde: .sundhedsguiden.dk